

RUKON DUST

FUNGICIDA POLVO SECO (DP)

INGREDIENTE ACTIVO	a) Iprodiona; b) Azufre
NOMBRE QUÍMICO	a) 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioxo-imidazolidin-1-carboximida; b) azufre
GRUPO QUÍMICO	Dicarboximidias + inorgánico
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	a) 5,5% p/p; b) 88,3% p/p DP (Polvo Seco)
MODO DE ACCIÓN	Contacto
FABRICANTE/ FORMULADOR	NEW TECH AGRO S.A. - CHILE
DISTRIBUIDOR EN CHILE	MABRUK®
TOXICIDAD	Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro
ANTÍDOTO	No tiene antídoto específico. Tratamiento N°18
AUTORIZACIÓN SAG N°	2630

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

RUKON DUST es un fungicida de contacto con acción preventiva, para el control de pudrición gris producida por *Botrytis cinerea* y pudrición ácida, causada por un complejo de microorganismos que incluyen bacterias, levaduras y hongos. Inhibe la respiración celular, altera la membrana celular y la actividad enzimática de los patógenos. Inhibe el desarrollo de las esporas mediante procesos oxidativos.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicaciones terrestres y aéreas.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Vides de mesa	Pudrición gris Botrytis cinerea	18	Aplicar vía espolvoreo en pinta y cosecha. Aplicar dos veces, con intervalos de 10 días.
Vides de mesa	Hongos del complejo de la pudrición ácida Alternaria alternata, Cladosporium sp. Aspergillus sp. Mucor sp. Rhizopus sp. Pnicillium expansum y Botrytis cinerea.	18	Aplicar vía espolvoreo, a partir de la pinta y en pre- cosecha. Aplicar dos veces por temporada con intervalos de 10 días.

RUKON DUST

FUNGICIDA POLVO SECO (DP)

PRECAUCIONES:

No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo (sobre 25°C). Deben transcurrir tres semanas entre una aplicación de **RUKON DUST** y una aplicación de aceite o de un producto formulado como concentrado emulsionable (EC). El uso continuado y en múltiples tratamientos durante el ciclo del cultivo de ciertos fungicidas puede producir resistencia de las cepas del patógeno que se intenta controlar. Se sugieren no más de dos aplicaciones por temporada y alternar con fungicidas de otras familias químicas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

No necesita preparación. Aplicar con un equipo convencional para aplicación de polvos secos, realizando un buen cubrimiento del cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Sólo es compatible con aquellos productos fitosanitarios aplicados vía polvo. No aplicar en aplicaciones seguidas con productos alcalinos o fuertemente oxidantes. Incompatible con formetate HCl y chinometionate.

FITOTOXICIDAD:

No presenta, cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso.

CARENCIA (días):

Vides de mesa: 3. Carencia fijada para Chile. Para cultivos de exportación es necesario atenerse a las exigencias del país de destino.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

Producto de **MABRUK**

MABRUK[®]
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO