

# gropolis® 240 SL



## Ingrediente activo:

Picloram-Potasio

## Grupo Químico:

Ácidos piridincarboxílicos.

## Concentración:

277 g/L, equivalente a 240 g/L a ácido de picloram

## Formulación:

Concentrado Soluble

## Registro SAG:

N° 3.657


**GROPOLIS® 240** ES UN HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO, QUE CONTROLA MALEZAS DE HOJA ANCHA Y LEÑOSAS.

- ▶ Tiene acción **sistémica y selectiva** y se usa para el control de malezas leñosas y de hoja ancha en los cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.
- ▶ La **mayoría de las plantas de hoja ancha** son susceptibles al herbicida, mientras los pastos y gramíneas son resistentes.



**Grupo III**

## ▶ HERBICIDA



- **Herbicida post-emergente**, con acción sistémica y específica.

- Acción selectividad sobre **malezas de hoja ancha y leñosas**.

- Formulación altamente soluble, para **rápida absorción** en hojas y tallos.

Presentación:



## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS PARA APLICACIÓN TERRESTRE

Cultivo	Malezas	Dosis cc / ha	Observaciones
Cebada, Trigo, Centeno, Avena	Falso té ( <i>Bidens aurea</i> ), Correhuela ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), Hierba de la culebra ( <i>Fumaria spp.</i> ), Margarita ( <i>Leuconthemum vulgare</i> ), Mil en rama ( <i>Achillea millefolium</i> ), Sanguinaria ( <i>Polygonum aviculare</i> ), Vinagrillo ( <i>Rumex acetosella</i> ), Arvejilla ( <i>Vicia sativa</i> ), Senécio ( <i>Senecio vulgaris</i> ), Manzanilla ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), Cardo ( <i>Cirsium vulgare</i> ), Pasto pinito ( <i>Spergula arvensis</i> ), Hierba del chanco ( <i>Hypochaeris radicata</i> ), Galega ( <i>Galega officinalis</i> ), Siete venas ( <i>Plantago lanceolata</i> ), Chinilla ( <i>Leontodon saxatilis</i> ), Duraznillo ( <i>Polygonum persicaria</i> ), Quinguilla ( <i>Chenopodium spp.</i> ), Diente de león ( <i>Taraxacum officinalis</i> ), Hierba azul ( <i>Echium spp.</i> ), Cardilla ( <i>Carthamus lanatus</i> ), Quilloi-Quilloi ( <i>Stellaria media</i> ), Enredadera anual ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	100 - 125	Aplicar desde que el cultivo tiene 4 hojas hasta fin de macolla. Cubrimiento: 100 - 200 L/ha
Nabo y Col Forrajera	Falso té ( <i>Bidens aurea</i> ), Correhuela ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), Hierba de la culebra ( <i>Fumaria spp.</i> ), Margarita ( <i>Leuconthemum vulgare</i> ), Mil en rama ( <i>Achillea millefolium</i> ), Sanguinaria ( <i>Polygonum aviculare</i> ), Vinagrillo ( <i>Rumex acetosella</i> ), Arvejilla ( <i>Vicia sativa</i> ), Senécio ( <i>Senecio vulgaris</i> ), Manzanilla ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), Cardo ( <i>Cirsium vulgare</i> ), Pasto pinito ( <i>Spergula arvensis</i> ), Hierba del chanco ( <i>Hypochaeris radicata</i> ), Galega ( <i>Galega officinalis</i> ), Siete venas ( <i>Plantago lanceolata</i> ), Chinilla ( <i>Leontodon saxatilis</i> ), Duraznillo ( <i>Polygonum persicaria</i> ), Quinguilla ( <i>Chenopodium spp.</i> ), Diente de león ( <i>Taraxacum officinalis</i> ), Hierba azul ( <i>Echium spp.</i> ), Cardilla ( <i>Carthamus lanatus</i> ), Quilloi-Quilloi ( <i>Stellaria media</i> ), Enredadera anual ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	125 - 200	Aplicar desde que el cultivo tenga 2 a 3 hojas hasta antes de la emisión del tallo floral. Cubrimiento: 100 – 300 L/ha.
Pino Insigne	Falso té ( <i>Bidens aurea</i> ), Correhuela ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), Hierba de la culebra ( <i>Fumaria spp.</i> ), Margarita ( <i>Leuconthemum vulgare</i> ), Mil en rama ( <i>Achillea millefolium</i> ), Sanguinaria ( <i>Polygonum aviculare</i> ), Vinagrillo ( <i>Rumex acetosella</i> ), Arvejilla ( <i>Vicia sativa</i> ), Senécio ( <i>Senecio vulgaris</i> ), Manzanilla ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), Cardo ( <i>Cirsium vulgare</i> ), Pasto pinito ( <i>Spergula arvensis</i> ), Hierba del chanco ( <i>Hypochaeris radicata</i> ), Galega ( <i>Galega officinalis</i> ), Siete venas ( <i>Plantago lanceolata</i> ), Chinilla ( <i>Leontodon saxatilis</i> ), Duraznillo ( <i>Polygonum persicaria</i> ), Quinguilla ( <i>Chenopodium spp.</i> ), Diente de león ( <i>Taraxacum officinalis</i> ), Hierba azul ( <i>Echium spp.</i> ), Cardilla ( <i>Carthamus lanatus</i> ), Quilloi-Quilloi ( <i>Stellaria media</i> ), Enredadera anual ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	125 - 200	Aplicar en pre-plantación. En post plantación, desde el establecimiento hasta los 3 años de edad. Cubrimiento: 100-300 L/ha
Pino Insigne	<b>Malezas arbustivas:</b> Retamilla ( <i>Teline monspessulana</i> ), Espinillo ( <i>Ulex europaeus</i> ), Maqui ( <i>Aristotelia chilensis</i> ), Zarzamora ( <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>R. constrictus</i> ), Romerillo ( <i>Baccharis spp.</i> )	0,3 - 1,0 L/ha	Aplicar sobre malezas en estado de plántula, o bien rebrotes en activo crecimiento. Para el control de tocones sin follaje, aumentar la dosis hasta 3 L/ha.

## RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS PARA APLICACIÓN AÉREA

Cultivo	Malezas	Dosis cc / ha	Observaciones
Cebada, Trigo, Centeno, Avena	Falso té ( <i>Bidens aurea</i> ), Correhuela ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), Hierba de la culebra ( <i>Fumaria spp.</i> ), Margarita ( <i>Leuconthemum vulgare</i> ), Mil en rama ( <i>Achillea millefolium</i> ), Sanguinaria ( <i>Polygonum aviculare</i> ), Vinagrillo ( <i>Rumex acetosella</i> ), Arvejilla ( <i>Vicia sativa</i> ), Senécio ( <i>Senecio vulgaris</i> ), Manzanilla ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), Cardo ( <i>Cirsium vulgare</i> ), Pasto pinito ( <i>Spergula arvensis</i> ), Hierba del chancho ( <i>Hypochaeris radicata</i> ), Galega ( <i>Galega officinalis</i> ), Siete venas ( <i>Plantago lanceolata</i> ), Chinilla ( <i>Leontodon saxatilis</i> ), Duraznillo ( <i>Polygonum persicaria</i> ), Quinguilla ( <i>Chenopodium spp.</i> ), Diente de león ( <i>Taraxacum officinalis</i> ), Hierba azul ( <i>Echium spp.</i> ), Cardilla ( <i>Carthamus lanatus</i> ), Quilloi-Quilloi ( <i>Stellaria media</i> ), Enredadera anual ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	100 - 125	Aplicar desde que el cultivo tiene 4 hojas hasta fin de macolla. Cubrimiento: 40 - 60 L/ha.
Pino Insigne	<b>Malezas arbustivas:</b> Retamilla ( <i>Teline monspessulana</i> ), Espinillo ( <i>Ulex europaeus</i> ), Maqui ( <i>Aristotelia chilensis</i> ), Zarzamora ( <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>R. constrictus</i> ), Romerillo ( <i>Baccharis spp.</i> )	100 - 300	Aplicar en pre-plantación. En post plantación, desde el establecimiento hasta los 3 años de edad. Cubrimiento: 40 - 60 L/ha.
Pino Insigne	<b>Malezas arbustivas:</b> Retamilla ( <i>Teline monspessulana</i> ), Espinillo ( <i>Ulex europaeus</i> ), Maqui ( <i>Aristotelia chilensis</i> ), Zarzamora ( <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>R. constrictus</i> ), Romerillo ( <i>Baccharis spp.</i> )	0,3 - 1,0 L/ha	Aplicar sobre malezas en estado de plántula, o bien rebrotes en activo crecimiento. Para el control de tocones sin follaje, aumentar la dosis hasta 3 L/ha.

- ▶ En caso de emergencia comunicarse con RITA CHILE: (02) 2777 1994
- ▶ ADVERTENCIA: Este folleto sólo contiene información de carácter referencial y no posee toda la información necesaria para el adecuado uso y manejo de los productos. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- ▶ Agregar la cantidad recomendada de Gropolis® 240 SL al estanque de preparación a medio llenar con agua limpia y agitar. Luego, completar el volumen de agua deseada y sin dejar de agitar para lograr la mezcla completa. Aplicar dentro de las pocas horas de haber hecho el preparado.

## MODO DE APLICACIÓN

- ▶ Realizar una aplicación por temporada en campos de cultivo y hasta 2 aplicaciones por temporada en forestales.
- ▶ Aplicar con boquilla de abanico plano, preferentemente antideriva. No aplicar durante horas de calor, follaje humedecido y con vientos mayores a 7 km/h para evitar su dispersión hacia plantas susceptibles como porotos, frutales, remolacha, papas.
- ▶ Requiere un período libre de precipitaciones de 4 horas, para ser absorbido.
- ▶ No aplicar en caso de rotación con leguminosas.
- ▶ No aplicar por sistemas de irrigación.
- ▶ En nabo forrajero, usar la dosis menor en malezas en primeros estados de crecimiento y la dosis mayor en malezas de mayor tamaño.

## COMPATIBILIDAD

- ▶ Gropolis® 240 SL es compatible con otros productos fitosanitarios de uso corriente.

## INCOMPATIBILIDAD

- ▶ No mezclar con herbicidas de contacto. Es incompatible en mezclas con preparados de pH fuertemente alcalino. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

## FITOTOXICIDAD

- ▶ No es fitotóxico en los cultivos para los que se recomienda el producto si se usa de acuerdo a las recomendaciones.

## EFFECTO SOBRE CULTIVOS SIGUIENTES

- ▶ No existen efectos para los cultivos recomendados, pero en caso de sembrarse otros cultivos de hoja ancha, como leguminosas y remolacha, se recomienda dejar un intervalo de 9 meses desde la última aplicación.

## TIEMPO DE REINGRESO

- ▶ Se recomienda no ingresar hasta 12 horas después de realizada la aplicación, para personas y animales.

## CARENCIAS

- ▶ No corresponde fijar carencias por el modo y momento de aplicación.