

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Tebuconazol, ingrediente activo de **SEEDCOVER**, pertenece al grupo químico de los Triazoles. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Durante la manipulación y aplicación del producto: usar mascarilla, guantes impermeables, overol impermeable y botas de goma.

Después del trabajo lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla por separado.

Almacenar en envases originales, debidamente cerrados, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No contaminar agua, otros plaguicidas, fertilizantes, alimentos o piensos, durante el almacenamiento. Mantener alejado del alcance de los niños, personas inexpertas o animales.

Riesgos ambientales: No tóxico para aves y abejas. Peligroso para peces, no contaminar drenajes o cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO DESTINAR GRANOS TRATADOS AL CONSUMO DE PERSONAS NI ANIMALES.

TRIPLE LAVADO DE ENVASES: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfóre el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

Síntomas de Intoxicación: No tiene síntomas específicos de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS: Para todos los casos que se presentan a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua corriendo, por al menos 15 minutos, manteniendo los ojos abiertos para facilitar la limpieza del producto. En el caso de que el afectado use lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Buscar atención médica.

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uña y pliegues cutáneos. Buscar atención médica.

Inhalación: Utilizar equipo de respiración adecuado durante el rescate. Remover a la persona afectada al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial, si hay dificultad para respirar administrar oxígeno. Buscar atención médica.

Ingestión: Inmediatamente dar a beber a la persona afectada, 2 vasos de agua. No inducir el vómito. Nunca dar nada a una persona inconsciente. Buscar atención médica.

Antídoto: No presenta antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: (2) 22777 19 94. Rotam de Chile Agroquímica Ltda: (2) 22339152.

SEEDCOVER

FUNGICIDA

Suspensión Concentrada para tratamiento de semillas (FS)

SEEDCOVER desinfectante de semilla sistémico y de contacto, utilizado para el control de los hongos, en los cultivos recomendados en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION%
Tebuconazol (*) p/v 6 % p/v (60 g/L)
Coformulantes c.s.p. 100 % p/v (1L)

(*) (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero
Nº 2731

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote Nº: Fecha Venc.:
Cont. Neto: X Litros.

Fabricado por:
Rotam Agrochemical Co.,Ltd
Unit 6, 26/F Trend Centre, No. 29 Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong

Importado y Distribuido por:
Rotam de Chile Agroquímica Ltda.
Providencia 2318 of. 31. Providencia.
Santiago- Chile.

INSTRUCCIONES DE USO:

SEEDCOVER desinfectante de semilla sistémico y de contacto, utilizado para el control de los hongos, en los cultivos recomendados en el cuadro de instrucciones de uso.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/100 kg de semilla)	Observaciones
Trigo, Triticale, Centeno, Avena, Cebada	Carbón volador o desnudo (<i>Ustilago tritici</i> , <i>Ustilago avenae</i>), carbón cubierto (<i>Ustilago ordei</i>), carbón hediondo (<i>Tilletia caries</i>) y septoria (<i>Septoria tritici</i>).	40-50	Para obtener una óptima aplicación de SEEDCOVER debe ser mezclado en forma homogénea con la semilla para asegurar una total cobertura, diluyendo la dosis recomendada en 1,5 a 2,0 L de agua. Utilizar dosis menores con baja presión de la enfermedad, y utilizar dosis mayores con alta presión de la enfermedad.
Maíz	Carbón de la panoja (<i>Sphaerotheca reiliana</i>)	80-90	

Para el tratamiento utilizar un tambor rotativo o una máquina diseñada especialmente para tal finalidad haciendo girar por lo menos 5 minutos para permitir una adecuada mezcla de **SEEDCOVER** con la semilla. El proceso debe ser realizado al aire libre y en lugar ventilado.

Condiciones determinantes para una aplicación segura y eficaz del producto: No aplicar con vientos superiores a 10 km/hr, no aplicar con Tº mayor a 25°C o alta humedad ambiental.

Compatibilidad: **SEEDCOVER** es compatible con PROTEAT 70 WS y con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

Incompatibilidad: es incompatible con aquellos productos que generan reacción alcalina o fuertemente oxidante.

Fitotoxicidad: No utilizar **SEEDCOVER** si no existe certeza de que la profundidad de siembra será un factor controlado. La semilla debe quedar depositada entre 3 a 5 cm de profundidad. **SEEDCOVER** puede ser fitotóxico en condiciones ambientales extremas como exceso de humedad o condiciones de sequía. **SEEDCOVER** no es fitotóxico para las especies recomendadas si se sigue las recomendaciones de uso de ésta etiqueta.

Período de Carencia: No corresponde establecer carencias por la época y forma de aplicación.

Reingreso al área tratada: Debido al tipo de aplicación (tratamiento de semillas), no corresponde establecer tiempo de reingreso tanto para personas como para animales.

NOTA AL COMPRADOR: El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de su aplicación y almacenaje.



CUIDADO



