

SEEDCOVER

INGREDIENTE ACTIVO	Tebuconazole
NOMBRE QUIMICO	(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentam-3-ol
GRUPO QUIMICO	Triazoles
CONCENTRACION Y FORMULACION	6,0% (60 g/L) Tebuconazole Suspensión Concentrada para tratamiento de semillas - FS
MODO DE ACCION	Sistémico y de contacto
FABRICANTE/FORMULADOR	Rotam Agrochemical Co.,Ltd, Hong Kong
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico
AUTORIZACION S.A.G. N°	2731

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

Desinfectante de semilla sistémico y de contacto, utilizado para el control de los hongos, en los cultivos recomendados en el cuadro de instrucciones de uso.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/100 kg de semilla)	Observaciones
Trigo, Triticale, Centeno, Avena, Cebada	Carbón volador o desnudo (<i>Ustilago</i> sp.), Carbón cubierto (<i>Ustilago</i> sp.), Carbón hediondo (<i>Tilletia</i> sp.) y Septoria (<i>Septoria tritici</i>).	40-50	Para obtener una óptima aplicación de SEEDCOVER® debe ser mezclado en forma homogénea con la semilla para asegurar una total cobertura, diluyendo la dosis recomendada en 1,5 a 2,0 L de agua.
Maíz	Carbón de la panoja (<i>Sphaerotheca reiliana</i>)	80-90	

Para el tratamiento utilizar un tambor rotativo o una máquina diseñada especialmente para tal finalidad haciendo girar por lo menos 5 minutos para permitir una adecuada mezcla de SEEDCOVER con la semilla. El proceso debe ser realizado al aire libre y en lugar ventilado.

Compatibilidad: SEEDCOVER® es compatible con PROTEAT 70 WS y con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

Incompatibilidad: es incompatible con aquellos productos que generan reacción alcalina o fuertemente oxidante.

Tiempo de reingreso al área tratada: Debido al tipo de aplicación (tratamiento de semillas), no corresponde establecer tiempo de reingreso tanto para personas como para animales.

Fitotoxicidad: No utilizar SEEDCOVER® si no existe certeza de que la profundidad de siembra será un factor controlado. La semilla debe quedar depositada entre 3 a 5 cm de profundidad. SEEDCOVER® puede ser fitotóxico en condiciones ambientales extremas como exceso de humedad o condiciones de sequía. SEEDCOVER® no es fitotóxico para las especies recomendadas si se sigue las recomendaciones de uso de ésta etiqueta.

Período de carencia: No corresponde establecer carencias por la época y forma de aplicación.

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NOTA AL COMPRADOR: El producto ha sido sometido a estrictos controles de calidad durante su fabricación con lo cual se garantiza el porcentaje del Ingrediente Activo señalado en la etiqueta. Debido a que el almacenamiento, manipulación y aplicación del producto se escapan de nuestro control directo, cualquier responsabilidad por riesgos eventuales derivados del uso del producto, serán del usuario.

Rotam de Chile Ltda.
(56-2) 2339152

