

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: Tebuconazol pertenece al grupo químico de los triazoles y Carbendazima pertenece al grupo químico de los bencimidazoles.

Evitar que el producto entre en contacto con ojos, piel o ropa. Evitar respirar vapores o neblinas de aspersión. Limpiar el equipo aplicador antes de utilizarlo con otro producto. Lavarse muy bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Luego la manipulación sacarse las ropas y lavarlas en forma prolija.

Durante la preparación y aplicación: Utilizar guantes impermeables, antiparras, overol impermeable y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.

Mantener alejado del alcance de los niños. Almacenar en envases originales debidamente cerrados en un lugar que sea cerrado, fresco, seco y bien ventilado.

Riesgos ambientales: Moderadamente tóxico para peces, organismos acuáticos y abejas. No tóxico para aves. No verter en drenajes ni cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO ANIMAL

PARA APLICACIONES AÉREAS SE DEBEN RESPETAR LAS DISPOSICIONES QUE A NIVEL REGIONAL HAYA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE

Instrucciones para el Triple Lavado. Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de Intoxicación: Producto peligroso si es ingerido, puede causar irritación de la piel y ojos. No tiene síntomas específicos de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS: Para todos los casos que se presentan a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua corriente, por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Conseguir ayuda médica. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Conseguir ayuda médica. **Inhalación:** Para realizar el rescate, ponerse protección respiratoria. Sacar al afectado de la zona de exposición y trasladarlo al aire fresco. Si el paciente no esta respirando, dar respiración artificial. Si el paciente presenta dificultad respiratoria, dar oxígeno. Conseguir ayuda médica. **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Solo si el afectado se encuentra consciente, se le puede dar un poco de agua para el enjuague de su boca. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Solicitar asistencia médica. **Antídoto:** No tiene antídoto conocido.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático y de soporte.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: 56 2 2777 19 94. Rotam de Chile agroquímica Ltda. 56 2 2233 91 52.

TANTOR®

FUNGICIDA

Suspensión Concentrada (SC).

TANTOR® es un fungicida sistémico, con acción protectora, curativa y erradicante, para ser usado en los cultivos indicados en la tabla de instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:	p/v (g/L)
Tebuconazol*	12,5% p/v (125 g/L)
Carbendazima**	12,5% p/v (125 g/L)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/v (1L)

* (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

**Bencimidazol-2-ilcarbamato de metilo

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2691

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Lote N°: _____ Fecha Venc.: _____
Cont. Neto: xx

Fabricado por:

Rotam Agrochemical Co. Ltd.

Unit 6, 26/F Trend Centre, No. 29 Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong, China

Importado y Distribuido por:

Rotam de Chile Agroquímica Ltda.

Providencia 2318 of 31. Providencia
Santiago - Chile

INSTRUCCIONES DE USO:

TANTOR® es un fungicida sistémico, con acción protectora, curativa y erradicante, para ser usado en los cultivos indicados en la tabla de instrucciones de uso de esta etiqueta.

CUADRO INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES TERRESTRES Y AÉREAS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Avena Trigo Cebada Centeno Triticale	Oídio (<i>Erysiphe graminis</i>), Mancha ocular (<i>Pseudocercospora</i> <i>sp.</i>), Rincosporiosis o escaldadura de la cebada, (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Septoriosis (<i>Septoria tritici</i>), Royas o polvillos (<i>Puccinia graminis</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia recóndita</i>), Helmintosporiosis (<i>Helminthosporium spp</i>)	1,0	Aplicar de preferencia en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con la espiga recién expuesta. Máximo dos aplicaciones por temporada con intervalo de 15 días. Aplique con un volumen de 200 L/ha en las aplicaciones terrestres. En aplicaciones aéreas usar volumen de aplicación de 40L/ha.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar en presencia de fuertes vientos que puedan provocar la deriva del producto fuera del área de aplicación y con lluvia inminente.

En aplicaciones aéreas usar volumen de aplicación 40 L/ha.

Medidas de protección para las abejas:

Retirar colmenas previo a la aplicación y no regresarlas al área de tratamiento antes de 48 a 72 horas después de la aplicación.

Aplicar al atardecer, temprano en la mañana, en horarios de baja actividad de las abejas, evitando la deriva.

Se recomienda, antes de aplicar el producto, eliminar las malezas que están en floración al momento de la aplicación y/o cortar la cubierta vegetal presente alrededor del cultivo.

Se debe notificar a los apicultores ubicados en un radio de mínimo de 3 kilómetros de la zona de tratamiento, al menos 72 horas previo a la aplicación con el fin de aplicar medidas de seguridad para sus abejas.

Incompatibilidad: No es compatible con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad: Puede producir fitotoxicidad en mezclas con herbicidas sulfonil ureas. No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones.

Tiempo de Reingreso: 4 horas después de la aplicación para humanos y animales.

Periodo de Carencia (días): 35 días para los cultivos indicados en las instrucciones de uso.

NOTA AL COMPRADOR: El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de su aplicación y almacenaje.

*TANTOR es marca registrada.



CUIDADO



